


Γενικές συμβουλές παραγωγής πατατών κατανάλωσης

έκδοση 2009 - 01



- * Ψηλή παραγωγή
- * Γεμάτοι κόνδυλοι
- * Ομοιόμορφο μέγεθος
- * Καλή ανθεκτικότητα στην Ακτινομύκωση
- * Καλή ποιότητα μαγειρέματος

Χαρακτηριστικά

Τύπος μαγειρέματος	AB
Ωρίμανση	Μεσοόψιμη
Παραγωγή	Πολύ ψηλή
Μέγεθος κονδύλων	Πολύ μεγάλοι
Σχήμα κονδύλων	Στρόγγυλοι-ωοειδείς/ωοειδ.
Αριθμός κονδύλων	Μέσος όρος
Χρώμα σάρκας	Ελαφρά κίτρινη
Χρώμα επιδερμίδας	Κίτρινη
Μούρα	Δεν έχει
Περίοδος λήθαργου	Πολύ μακρής
Φύτρωμα	Κανονικό
Ευαισθησία στο Sencor	Μέτρια ευαίσθητη
Ανάπτυξη φυλλώματος	Καλή
Εσωτερικοί μώλωπες	Μέτρια ευαίσθητη
Κονδυλοποίηση φύτρων	Μάλλον ευαίσθητη
Ξηρή ουσία	17,7
UWW (βάρος σε νερό)	320
Χρυσονηματώδης	Ανθεκτική: Ro1,4 Ευαίσθητη: Ro2/3,5 Pa2,3
Καρκίνος των κονδύλων	Ανθεκτική: fysio 1
Δακτυλιοειδής κηλίδωση*	Ανθεκτική
Περονόσπορος φύλλων	Ευαίσθητη
Περονόσπορ. κονδύλων	Ελαφρά ευαίσθητη
Ακτινομύκωση	Ελαφρά ευαίσθητη
Σπογγοσπορίωση	Ευαίσθητη
PVYη	Ελαφρά ευαίσθητη
Ανοχή κονδύλων Yntn	Ευαίσθητη

*Προκαλείται από τον ιό TRV

Πληθυσμοί φυτών

Ενδεικτικές αποστάσεις φύτευσης όταν η απόσταση μεταξύ των αυλακιών είναι 75 εκ.


28/35 χλ. 5.100 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 26 εκ.
35/50 χλ. 4.750 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 28 εκ.
50/55 χλ. 4.450 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 30 εκ.

Λίπανση

Η λίπανση είναι περίπου όμοια με εκείνη της Sprunta. Η Αζωτούχος λίπανση είναι περίπου 25 χλγ Ν/στρ. περιλαμβανομένων και των αποθεμάτων εδάφους. Συνιστάται σπαστή εφαρμογή, 2/3 στη βασική και 1/3 αμέσως μετά τη κονδυλοποίηση. Κάλιο και Φώσφορο ανάλογα με τις απαιτήσεις του εδάφους. Δεν συνιστώνται Οργανικά λιπάσματα.


Γενικές συμβουλές παραγωγής πατατών κατανάλωσης

Προετοιμασία και φύτεμα




- Ο λήθαργος είναι μακρύς με ισχυρή επικράτηση του κορυφαίου φύτρου.
- Βγάλε το σπόρο από την αποθήκη στο κατάλληλο χρόνο. Συνιστάται θέρμανση του χώρου για να ξυπνήσουν τα φύτερα.
- Μη φυτέψεις σε πολύ κρύο έδαφος. Η Fabula είναι λίγο ευαίσθητη στη κονδυλοποίηση των φύτρων.
- Φύτεψε λίγο πιο βαθιά από το κανονικό.
- Τα καλύτερα αποτελέσματα πετυχαίνονται σε ελαφρά χωράφια με καλή δομή εδάφους.

Τι πρέπει να προσέξεις κατά τη καλλιέργεια



- Στην αρχή η ανάπτυξη είναι λίγο αργή. Αργότερα το φύλλωμα αναπτύσσεται καλά.
- Το χρώμα των φύλλων είναι ελαφρά πράσινο (χλωμό).
- Ο αριθμός των κονδύλων είναι μικρός.
- Οι ψεκασμοί για τη καταπολέμηση του Περονόσπορου πρέπει να κανονικά και στο κατάλληλο χρόνο..

Καταστροφή φυλλώματος και συγκομιδή



- Πριν τη συγκομιδή η επιδερμίδα των κονδύλων πρέπει να “ψηθεί”. Συγκόμισε με προσοχή.
- Η Fabula δεν είναι ευαίσθητη στο μελάνιασμα και στις μηχανικές βλάβες.
- Περίορισε το ύψος πτώσης κατά τη συγκομιδή και την αποθήκευση.

Αποθήκευση



- Η Fabula αποθηκεύεται εύκολα όταν γίνει προσεκτικά η επούλωση των πληγών και το στέγνωμα των κονδύλων μετά τη συγκομιδή.
- Μεγάλες ζημιές στους κονδύλους και κακή επούλωση πληγών μπορούν να προκαλέσουν έντονη αφυδάτωση των κονδύλων.
- Εξασφάλισε μια μάλλον χαμηλή και σταθερή θερμοκρασία αποθήκευσης διότι η ποικιλία είναι μάλλον ευαίσθητη στην Αργυρόχρωμη Κηλίδωση.